

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
- Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo, na: <https://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>.
Nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.
- Tyto informace mohou být také hlášeny společnosti AstraZeneca Czech Republic s.r.o. prostřednictvím <https://contactazmedical.astrazeneca.com>; na e-mail: czdrugssafety@astrazeneca.com; nebo tel: +420 222 807 111.

Kontaktní informace

**Pro zdravotnické pracovníky:
Pro případ nouze – v současné době
jsem léčen(a) přípravkem ENHERTU.**

**Kontaktní údaje mého ošetřujícího
lékaře:**

.....
Jméno lékaře/sestry

.....
Telefon do ordinace lékaře/sestry

Karta pacienta verze 3.0
Schváleno SÚKL: 02/2024 | CZ-5618

Karta pacienta

ENHERTU ▼
trastuzumab deruxtekan

.....
▼ **Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.**
.....

Karta pacienta verze 3.0
Schváleno SÚKL: 02/2024 | CZ-5618

Na této kartě nejsou uvedeny všechny možné nežádoucí účinky a je třeba se seznámit i s dalšími možnými nežádoucími účinky v příbalové informaci pro pacienta, kterou lze vyhledat na <https://www.olecich.cz> po zadání názvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL.

ENHERTU ▼

trastuzumab deruxtekan

Přečtěte si tyto informace dříve, než začnete používat přípravek ENHERTU, a poté před každou infuzí.

Tuto kartu byste měli mít neustále u sebe a ukázat ji každému lékaři, kterého navštívíte (například pokud Váš ošetřující lékař není k dispozici nebo pokud cestujete).

Vážné plicní potíže, které se mohou při léčbě vyskytnout

Pacienti léčení přípravkem ENHERTU mohou být ohroženi závažnými a potenciálně život ohrožujícími nežádoucími účinky týkajícími se plic (intersticiální plicní onemocnění či pneumonitida).

Pokud během léčby zaznamenáte některé z následujících známek nebo příznaků, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

Před zahájením léčby přípravkem ENHERTU a před podáním každé infuze

Informujte svého lékaře o jakémkoli problému s plícemi nebo se srdcem, který máte nebo jste měl(a) v minulosti, včetně zánětu plic známého jako intersticiální plicní onemocnění (*interstitial lung disease*; ILD);

Za žádných okolností se nepokoušejte léčit tyto příznaky sami:

- **kašel**
- **dušnost**
- **horečku**
- **jiné nové či zhoršující se problémy s dýcháním**