

AMBROXOL EUPHAR 15 mg/5 ml

52/853/11-C

DR: L

D: EUPHAR S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Ambroxoli hydrochloridum 300 mg v 100 ml

PP: Téměř bezbarvý, čirý roztok bez cizích částecí, s malinovou vůní.

Lahvička z hnědého skla o objemu 100 ml (3. hydrolytická třída) uzavřená bílým samotěsnícím uzávěrem (PP/ LDPE), odměrka 10 ml (PP)

B: POR SIR 1X100ML/300MG LAG kód SÚKL: 0157604

IS: Expectorantia, mucolytica

ATC: R05CB06

PE: 24

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření: Uchovávejte v chladničce.

Po prvním otevření: 30 dnů

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

ZI: Mukolytická léčba (napomáhající odkašlávání) akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

NICORETTE INHALÁTOR 15 mg

87/852/11-C

DR: S

D: MCNEIL AB, HELSINGBORG, Švédsko

S: Nicotinum 15 mg

PP: Bílý až téměř bílý porézní váleček obsahující léčivou a pomocnou látku.

Porézní váleček je umístěn v polyethylenovém transparentním pouzdra zataveném po obou stranách hliníkovou fólií s potiskem "NICORETTE" a číslem šarže; blister; bílá dvoudílná kuřácká špička s hroty uvnitř; krabička.

B: INH LIQ 4X15MG BLI kód SÚKL: 0166999

INH LIQ 20X15MG BLI kód SÚKL: 0167000

IS: Varia

ATC: N07BA01

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Po otevření pouzdra s porézním válečkem: 48 hodin

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

ZI: Přípravek je určen k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků tím, že pomáhá kuřákům k dočasné abstinenci kouření, umožňuje redukci kouření kuřákům neschopným ukončit kouření nebo kuřákům, kteří nechtějí kouření ukončit.

NIQUITIN MINT 2,5 mg ORODISPERGOVATELNÝ FILM 87/655/11-C

DR: S

D: BEECHAM GROUP PLC TRADING AS GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD, Velká Británie

S: Nicotinum 2.5 mg

PP: Průhledný film přibližně 20 mm na 30 mm

Každý nikotinový film je uložen v laminovaném sáčku z polyethylentereftalátu (PET)/hliníku/polyakrylonitrilu (PAN).

B: ORM FLM DIS 10X2.5MG SCC kód SÚKL: 0165158
ORM FLM DIS 15X2.5MG SCC kód SÚKL: 0165159
ORM FLM DIS 30X2.5MG SCC kód SÚKL: 0165160
ORM FLM DIS 60X2.5MG SCC kód SÚKL: 0165161
IS: Varia
ATC: N07BA01
PE: 18
ZS: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI: Léčba závislosti na tabáku.

ULTRACAIN 1:100 000

01/847/11-C

DR: OE RP: D
D: SANOFI-AVENTIS, S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: Articaini hydrochloridum 68 mg
Epinephrinum 0.017 mg v 1,7 ml
PP: Čirý, bezbarvý, izotonický roztok.
Roztok má pH v rozmezí 3,0 až 5,0. Osmolarita: 271 - 322 mOsmol/l
Zásobní vložka z bezbarvého skla (typu I) s odlamovacím hliníkovým víčkem a bromobutylovým gumovým uzávěrem, papírová krabička
B: INJ SOL 100X1.7ML ZVL kód SÚKL: 0171171
IS: Anaesthetica (lokální)
ATC: N01BB58
PE: 30
ZS: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte zásobní vložky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: Indikován k lokální anestezii u dospělých a dětí ve věku od 4 let (infiltrační a svodná anestezie) ve stomatologii. - chirurgický zákrok na sliznici a kosti vyžadující silnější ischemii, - chirurgický zákrok na zubní dřeni (amputace nebo extirpace), - extrakce roztržitého/zlomeného zubu (osteotomie), - protrahovaná chirurgická intervence, - perkutánní osteosyntéza, - cystektomie, - mukogingivální intervence, - apikoektomie.

ULTRACAIN 1:200 000

01/846/11-C

DR: OE RP: D
D: SANOFI-AVENTIS, S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: Articaini hydrochloridum 68 mg
Epinephrinum 0.0085 mg v 1,7 ml
PP: Čirý, bezbarvý, izotonický roztok.
Roztok má pH v rozmezí 3,0 až 5,0. Osmolarita: 271 - 322 mOsmol/l
Zásobní vložka z bezbarvého skla (typu I) s odlamovacím hliníkovým víčkem a bromobutylovým gumovým uzávěrem, papírová krabička
B: INJ SOL 100X1.7ML ZVL kód SÚKL: 0171172
IS: Anaesthetica (lokální)
ATC: N01BB58
PE: 30
ZS: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte zásobní vložky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: Indikován k lokální anestezii u dospělých a dětí ve věku od 4 let (infiltrační a svodná

anestezie) ve stomatologii. Rutinní zákroky jako nekomplikované jednoduché a vícečetné extrakce, ošetření zubního kazu a příprava pro nasazení korunek.
