

Léčivé přípravky obsahující amlodipin-besilát jako monokomponentu nebo amlodipin-besilát v dalších kombinacích:

SmPC bod 4.5

Při současném užívání takrolimu s amlodipinem existuje riziko zvýšené hladiny takrolimu v krvi. Aby se zamezilo toxicitě takrolimu, je u pacientů léčených takrolimem při současném podávání amlodipinu třeba monitorovat hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby upravit dávkování takrolimu.

Klarithromycin je inhibitor CYP3A4. U pacientů užívajících klarithromycin současně s amlodipinem existuje zvýšené riziko hypotenze. Pokud je amlodipin podáván současně s klarithromycinem, doporučuje se pečlivě pacienty sledovat.

SmPC bod 4.8

Třída orgánových systémů (SOC) Poruchy nervového systému: Extrapramidová porucha, frekvence „Není známo“

PIL bod 2

Takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi organismu, umožňuje tělu přijmout transplantovaný orgán)

Klarithromycin (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi)

PIL bod 4

Není známo: třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze