

Léčivé přípravky obsahující ramipril jako monokomponentu nebo ramipril v dalších kombinacích:

SmPC bod 4.5

Trimethoprim, včetně podávání fixní kombinace se sulfamethoxazolem (kotrimoxazol):

U pacientů užívajících ACE inhibitory a trimethoprim nebo fixní kombinaci trimethoprimu se sulfamethoxazolem (kotrimoxazol) byla pozorována zvýšená incidence hyperkalemie.

Inhibitory mTOR: U pacientů současně užívajících inhibitory mTOR (např. temsirolimus, everolimus, sirolimus), existuje zvýšeno riziko angioedému. Při zahajování léčby je nutná opatrnost.

SmPC bod 4.8

Třída orgánových systémů (SOC) Endokrinní poruchy: Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH), frekvence výskytu „není známo“.

PIL bod 2

Trimethoprim a kotrimoxazol (k léčbě infekce způsobené bakteriemi)

Temsirolimus (k léčbě nádorových onemocnění)

Everolimus (k prevenci rejekce štěpů)

PIL bod 4

Není známo: koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které mohou být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). Máte-li tyto příznaky, co nejdříve kontaktujte svého lékaře.