Změny, které mají být vloženy do příslušných bodů informací o přípravku léčivých přípravků obsahujících léčivou látku ranitidin (nový text **podtržený a tučně**)

Souhrn údajů o přípravku

Bod 4.5

Erlotinib a léčivé přípravky ovlivňující pH

Současné podávání ranitidinu 300 mg a erlotinibu snížilo expozici erlotinibu [AUC] o 33 % a maximální koncentrace [Cmax] o 54 %. Pokud však byl erlotinib podáván 2 hodiny před nebo 10 hodin po podání ranitidinu 150 mg dvakrát denně, klesly expozice erlotinibu [AUC] jen o 15 % a maximální koncentrace [Cmax] jen o 17 %.

Příbalová informace

Bod 2

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete <přípravek> X <užívat> <používat>

Další léčivé přípravky a <přípravek>X

Pokud užíváte erlotinib, lék užívaný k léčbě určitých typů rakoviny, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat <přípravek> X. Ranitidin, obsažený v <přípravku> X, může snížit množství erlotinibu ve vaší krvi a lékař možná bude muset upravit vaši léčbu, pokud ho užíváte v době, kdy užíváte erlotinib.