

INFORMACE PRO OŠETŘUJÍCÍ LÉKÁŘE

Tomuto pacientovi byl předepsán přípravek ASPAVELI® (pegceta-
alních infekcí, jako jsou například infekce způsobené bakteriemi
Streptococcus pneumoniae, *Neisseria meningitidis* a *Haemophilus*
influenzae typu B.

- Závažné bakteriální infekce se mohou rychle stát život ohrožujícími nebo fatálními, pokud nejsou včas rozpoznány a léčeny.
- U pacienta pečlivě sledujte výskyt časných známek a příznaků závažné infekce a podezření na infekci ihned vyhodnoťte. Znamě infekce je nutno okamžitě léčit.

- V případě jakéhokoli podezření na závažnou infekci co nejdříve kontaktujte pacientova předepisujícího lékaře. Další informace o přípravku ASPAVELI® získáte přečtením celého dokumentu Souhrn údajů o přípravku.

▲ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychle získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Nežádoucí účinky můžete nahlásit na:

drugsafety@sobi.com, +420 296 183 236.

Pacienti užívající přípravek ASPAVELI® musí tuto kartu neustále nosit u sebe. Před vydáním přípravku ASPAVELI® musí pacienti ukázat lékařníkovi své referenční číslo řízené distribuce (CDRN).

TUTO KARTU NEUSTÁLE NOSTE U SEBE

UKAŽTE JI KAŽDÉMU ZDRAVOTNICKÉMU PRACOVNÍKOVI, KTERÝ VÁS BUDE OŠETŘOVAT, VČETNĚ OŠETŘENÍ V NEMOCNICI.

Přípravek ASPAVELI® může zvyšovat riziko závažných, až život ohrožujících infekcí, pokud nejsou včas rozpoznány a léčeny. Pokud u sebe pozorujete kteroukoli z následujících příznaků závažné infekce, ihned kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte ošetření na lékařské pohotovosti:

- bolest hlavy a horečka,
 - horečka a vyrážka,
 - horečka se zimnicí či třesavkou nebo bez nich,
 - dušnost,
 - rychlý srdeční tep,
 - studená vlhká pokožka
-
- bolest hlavy se ztuhlým krkem nebo ztuhlými zády,
 - bolest hlavy s pocitem na zvracení (nevolností) nebo zvracením,
 - oči citlivé na světlo,
 - bolesti svalů s příznaky podobnými chřipce,
 - zmatenost,
 - extrémní bolest nebo nepříjemné pocity.

Během léčby a po dobu 2 měsíců od podání poslední dávky noste tuto kartu neustále u sebe. Riziko závažné infekce může trvat po dobu několika týdnů po poslední dávce.

Ukažte tuto kartu každému zdravotnickému pracovníkovi, který Vás bude ošetřovat.

Jméno pacienta

Referenční číslo řízené distribuce (CDRN)

Jméno předepisujícího lékaře

Telefonní číslo předepisujícího lékaře