


Karta

s upozorněním
pro pacienta
k přípravku





Simponi[®]
golimumabum

v předplněné injekční stříkačce



Ukažte tuto kartu každému lékaři, který Vás léčí.

Tento tištěný materiál může lékař poskytnout pouze pacientům, kterým předepsal přípravek Simponi 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. V souladu s českou legislativou nesmí být umístěn v čekárnách zdravotnických zařízení ani na jiných veřejně přístupných místech.



Tato karta obsahuje důležité informace týkající se podávání Simponi®, které potřebujete znát před zahájením i v průběhu léčby tímto přípravkem.



1 Infekce

Pokud se léčíte přípravkem Simponi®, můžete se snadněji nakazit infekcemi. Infekce mohou postupovat rychleji a mohou být závažnější. Navíc se mohou znovu objevit některé dříve prodělané infekce.

1.1 Před léčbou přípravkem Simponi®

- Informujte svého lékaře, pokud máte nějakou infekci. Přípravkem Simponi® nesmíte být léčen(a), pokud trpíte tuberkulózou (TBC) nebo jinou závažnou infekcí.
- Měl(a) byste podstoupit vyšetření na TBC. Je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud jste někdy v minulosti trpěl(a) TBC nebo pokud jste byl(a) v těsném kontaktu s někým, kdo měl TBC.
- Měl(a) byste podstoupit vyšetření na HBV infekci.

Vyšetření na TBC

Požádejte svého lékaře, aby níže zaznamenal druh a datum posledního/posledních **vyšetření na TBC**:

Druh vyšetření

Datum vyšetření


Druh vyšetření

Datum vyšetření

- ☐ Informujte svého lékaře, pokud víte nebo máte podezření, že jste nosičem viru hepatitidy B.

1.2 v průběhu a po ukončení léčby přípravkem Simponi®

- Neprodleně vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky infekce, například horečka, únava, (přetrvávající) kašel, dušnost nebo chřipkové příznaky, úbytek tělesné hmotnosti, noční pocení, průjem, rány, problémy se zuby a pocit pálení při močení.





② Srdeční selhání

Před léčbou přípravkem Simponi® informujte svého lékaře, pokud jste měl(a) v minulosti srdeční selhání. Pokud trpíte středně těžkým až těžkým srdečním selháním, nesmíte být přípravkem Simponi® léčen(a).

2.1 v průběhu a po ukončení léčby přípravkem Simponi®

- Pokud se u Vás objeví příznaky srdečního selhání (např. dušnost nebo otoky nohou), vyhledejte ihned lékaře.

③ Data, kdy vám byl
přípravek Simponi® podán

První podání

Následná podání

4 Další informace

- Dbejte prosím také na to, abyste při každé návštěvě lékaře u sebe měl(a) seznam všech dalších léků, které užíváte.
- Noste tuto kartu u sebe po celou dobu léčby přípravkem Simponi® a následně po dobu 6 měsíců po poslední dávce, protože nežádoucí účinky se mohou objevit dlouho po Vaší poslední dávce přípravku Simponi®.
- Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci k přípravku Simponi® před tím, než začnete tento lék užívat.




Jméno pacienta

Jméno lékaře

Telefon na lékaře





Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6
Česká republika

02-12-SIM-2011-CZ-2744-C