

Duodopa SC[®]

(foslevodopa/foskarbidopa)

pro léčbu pokročilé Parkinsonovy nemoci.

Tato příručka pro pacienty obsahuje důležité bezpečnostní informace, o kterých byste měli vědět.

**Mějte prosím tuto příručku k dispozici,
když se chystáte použít tento lék.**

CZ-PRODD-230011

abbvie

Proč bych si měl/a tuto příručku přečíst?

Duodopa SC® se používá k léčbě příznaků pokročilé Parkinsonovy nemoci.

Tento přípravek se používá v případě, kdy jiné léky k léčbě příznaků tohoto onemocnění již neúčinkují tak dobře jako dříve.

Vy nebo Váš ošetřovatel Vám bude podávat tento lék pod kůži přes malou plastovou hadičku (kanylu) do oblasti kolem pupku. Tato oblast je místem zavedení infuze.

Tento lék se dostává do těla prostřednictvím hadičky nepřetržitě 24 hodin denně.

Někteří pacienti užívající tento lék mohou mít následující kožní problémy v místech, kde se kanyla zavádí do těla:

- **Kožní infekce:** Nastává v případech, kdy se bakterie dostanou do kůže. Kožní infekce se může stát vážnou, když se bakterie dostanou do krve a rozšíří se po celém těle. Tomu se říká sepse.
- **Kožní reakce:** Nastává, když je pokožka podrážděná/zanícená.

Tato příručka pro pacienty pomůže Vám a Vašemu ošetřovateli pochopit:



Jak si vybrat místo pro zavedení infuze



Jak rozpoznat kožní infekci nebo kožní reakci v místě zavedení infuze



Co můžete udělat, abyste snížili riziko infekce nebo podráždění v místě zavedení infuze



Co dělat v případě, že máte infekci nebo podráždění v místě vpichu infuze



Kde najdete více informací o Vašem léku



Jak si vybrat místo pro zavedení infuze

Je důležité pravidelně měnit místo zavedení infuze. Díky tomu zůstane Vaše kůže zdravá a také to umožní správné podání léku.

Jako místo zavedení infuze můžete použít břišní oblast, pokud Vám lékař neřekne, abyste použili jiné místo. Ujistěte se, že místo, které si pro zavedení vyberete, je vzdáleno od pupku alespoň 5 cm (asi na délku malíčku).


- Vyhýbejte se linii nošení pásku, protože tato oblast může být podrážděná tlakem pásku na pokožku. Vyhýbejte se pokožce, která je zjizvená, ztvrdlá nebo pokrytá striemi.
- Vyhýbejte se jakýmkoli kožním záhybům nebo záhybům, kde se tělo přirozeně hodně ohýbá.
- Použijte nové infuzní komponenty (kanylu/ hadičku) při každé změně místa vpichu infuze.

Měňte místo vpichu každé 3 dny nebo dříve v závislosti na změnách na kůži (jako je zarudnutí, otok a bolest).

Nové místo vpichu musí být alespoň 2,5 cm (asi na dva prsty) vzdáleno od místa, které jste použili naposledy.

Po použití místa vpichu nepoužívejte znovu stejné místo alespoň 12 dnů – to pomůže, aby se Vaše pokožka zcela zahojila.

Existují různé způsoby, které Vám pomohou zapamatovat si poslední použité místo vpichu infuze, abyste jej nepoužili znovu příliš brzy. Jedním ze způsobů je představit si, že Vaše břicho jsou hodiny. Kanylu můžete zavádět pokaždé v jiném “dvouhodinovém” intervalu. Můžete začít ve 12 hodin, pokračovat ve 14 hodin, poté v 16 hodin a tak dále.




Abyste měli přehled o aplikaci, запиšte si datum a místo zavedení infuze.



Jak rozpoznat kožní infekci nebo kožní reakci v místě zavedení infuze

Všímejte si změn na pokožce tam, kde je kanyla zavedena do kůže. Kožní změny se mohou objevit s horečkou nebo bez ní a zahrnují:

- zarudnutí
- pokožku teplou na dotek
- otok
- citlivost/bolest
- změny barvy pokožky, když na ni zatlačíte





Co můžete udělat, abyste snížili riziko infekce nebo podráždění v místě zavedení infuze

V místě infuze se mohou objevit infekce nebo kožní reakce. Níže jsou uvedeny body, které je třeba zvážit při manipulaci s infuzí.



Pro přípravu infuze použijte dobře osvětlené místo, které je čisté a rovné (například stůl).



Při přípravě infuze udržujte místo vpichu infuze a infuzní sadu čisté a sterilní.



Vždy si umyjte ruce mýdlem a vodou a osušte je papírovou utěrkou. Potom se už nedotýkejte ničeho znečištěného.



Nedovolte, aby se hrot injekční stříkačky, adaptér na lahvičku, hadička nebo konektor dotýkaly znečištěného povrchu.



Opatrně zlikvidujte všechny použité materiály, které mohou být kontaminovány.



Po výběru místa infuze otřete pokožku alkoholovým tamponem. Dbejte na to, abyste otírali jedním směrem, abyste neznečistili vydezinfikované místo. Nechte místo zaschnout alespoň 1 minutu.

Měňte místo vpichu každé 3 dny nebo dříve v závislosti na změnách na kůži (jako je zarudnutí, otok a bolest).



Při výběru nového místa vpichu nepoužívejte stejné místo alespoň 12 dnů. To pomůže, aby se Vaše pokožka zcela zahojila.



Vždy dodržujte vzdálenost 2.5 cm (asi na 2 prsty) od místa, které jste použili jako místo vpichu naposledy.



Při změně místa vpichu infuze vždy použijte novou kanylu a hadičku.



Ostříhejte si všechny chloupky kolem místa vpichu infuze nůžkami. Pomůže to kanyle lépe se přichytit k Vaší pokožce. Pokud si musíte pokožku v místě vpichu oholit, počkejte jeden den před použitím tohoto místa.



Noste pohodlné oblečení, které nebude dráždit kůži v místě vpichu



Co byste měli dělat, pokud máte infekci nebo podráždění v místě vpichu infuze

Změňte místo vpichu infuze – nečekejte 3 dny. Kontaktujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka, pokud máte následující příznaky:

- zarudnutí
- pokožku teplou na dotek
- otok
- citlivost/bolest
- změny barvy pokožky, když na ni zatlačíte

Nepoužívejte infikované místo vpichu alespoň 12 dnů nebo dokud se nezahojí.



Kde najdete další informace o Vašem léku

Tento přehled nežádoucích účinků není úplný a je třeba se seznámit i s možnými dalšími nežádoucími účinky, jejichž výčet naleznete v Příbalové informaci pro pacienta (PIL). PIL je distribuována v každém balení léčivého přípravku a lze ji také vyhledat na <http://www.olecich.cz> po zadání názvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL. Více informací o Vašem léku naleznete také v návodu k použití (IFU), který je součástí Vašeho léku (foslevodopa/foskarbidopa).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků (NÚ), sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli NÚ, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>.

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Tato informace může být také hlášena společnosti AbbVie na e-mail: safety-cz@abbvie.com.