

NÁSLEDNÁ PÉČE O PACIENTA

Tento průvodce následnou péčí o pacienta uvádí osvědčené postupy k zajištění nejlepšího možného výsledku léčby. Protože má každý pacient odlišné potřeby, harmonogram sledování a vyšetřování pacienta je možné individuálně upravit.

Období po propuštění pacienta	Telefonický kontakt	Kontrola v ambulanci
1. den	X	
3. den	X	
12. den	X	
1. měsíc		X
6. týden	X	X
2. měsíc	X	
3. měsíc		X
5. měsíc	X	
6. měsíc		X

TELEFONICKÝ KONTAKT

Oblasti, na které je třeba se zeptat při každém telefonickém kontaktu:

PŮSOBNÍ DÁVEK • Jak se cítíte během dne?

- Jak působí ranní dávka?
- Účinkuje vaše léčba během dne dobře? (v souvislosti s kontinuálním dávkováním)
- Jak působí mimořádná dávka? Kolik mimořádných dávek denně potřebujete?
- Jaké je to v noci? Berete si večer nebo během noci nějaká antiparkinsonika?

MANIPULACE S PUMPOU A SONDOU V PRAXI • Měl/a jste nebo máte nějaké problémy s pumpou nebo sondou?

Otázky související s pumpou

- Jste schopen (schopna) pumpu spustit, zastavit a podat mimořádnou dávku?
- Jste schopen (schopna) systém připojit, tj. pumpu ke kazetě a kazetu k sondě PEG/J?
- Stalo se vám, že by pumpa spustila varovný signál?
- Vyhovují vám doplňky, ve kterých pumpu nosíte?
- Měnil(a) jste baterie v pumpě? Pokud ano, byl(a) jste schopen (schopna) tak učinit bez problémů?

Otázky související se sondou

- Daří se vám večer proplachovat vnitřní sondu?
- Jsou konektory na sondě v pořádku?
- Jsou spoje na sondě a sonda suché? (Neprosakují?)
- Y-konektor je třeba proplachovat jednou za týden. Máte s tím nějaké problémy?

STOMIE (VÝVOD) • Zkontrolujte, zda se neobjevily nějaké komplikace nebo jejich časně známky.

- Jak stomie vypadá?
- Je čistá?
- Je suchá?
- Objevují se nějaké známky zčervenání?
- Cítíte bolest v žaludku?

DALŠÍ

- Víte, kam zatelefonovat v případě dotazů a komplikací s léčbou?

KONTROLA V AMBULANCI

Je třeba, aby si pacienti před kontrolou v ambulanci zapisovali „ON-OFF periody“ po dobu nejméně dvou dnů. Pět dnů v měsíci stačí.

PŮSOBNÍ DÁVEK • Jak se cítíte během dne?

Společně s pacientem vyhodnoťte „ON-OFF periody“ a zeptejte se:

- Jak působí ranní dávka?
- Účinkuje vaše léčba během dne dobře? (v souvislosti s kontinuálním dávkováním)
- Jak působí mimořádná dávka?

Sociální situace a nálada

- Povězte mi o svých společenských aktivitách? (Došlo ke zlepšení?)
- Jsou nějaké aktivity, které jste nemohl(a) vykonávat dříve a nyní můžete?
- Jak se cítíte po duševní stránce? (Deprese? Zlepšení?)
- Máte pocit větší motivace a větší energie? Došlo během uplynulé doby ke změně?

Stav v noci

- Jak se cítíte v noci?
- Berete si večer nebo během noci nějaká antiparkinsonika?
- Máte noční můry/živé sny?
- Máte problémy s nespavostí?

APLIKACE DÁVKY

Zde byste měl(a) zjistit, zda pacient aplikuje dávku správně.

- Změnil(a) jste některou z dávek – ranní, kontinuální nebo mimořádnou dávku?
- Pokud ano, kterou z uvedených dávek a jak často ji měníte?
- Kolik mimořádných dávek denně potřebujete?

Užíváte doma kromě levodopy ještě další léky?

- Agonisty dopaminu?
- Inhibitor COMT?
- Jiné?

STOMIE (VÝVOD)

Zkontrolujte, zda se neobjevily nějaké komplikace nebo jejich časné známky.

- Jak stomie vypadá?
- Je čistá?
- Je suchá?
- Objevují se nějaké známky zčervenání?
- Cítíte bolest v žaludku?

OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ SE SONDOU

- Daří se vám večer proplachovat vnitřní sondu?
- Jsou konektory na sondě v pořádku?
- Jsou spoje na sondě a sonda suché? (Neprosakují?)
- Y-konektor je třeba proplachovat jednou za týden. Máte s tím nějaké problémy?

NOŠENÍ PUMPY

- Jak pumpu nosíte?
- Vyhovují vám doplňky, ve kterých pumpu nosíte?

Jakékoliv podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>.

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz. Tato informace může být také hlášena společností AbbVie s.r.o.