

Esmya® 5 mg tablety

Karta pacientky

CZ

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek užívat?

Přípravek Esmya může způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jedním z možných nežádoucích účinků je závažné poškození jater. V této kartě najdete informace o krevních testech, které budete v průběhu léčby podstupovat, a o tom, jak postupovat, jestliže se u Vás objeví nežádoucí účinky související s játry.

Neužívejte přípravek Esmya, jestliže máte problémy s játry. Pokud víte, že máte problémy s játry, nebo pokud máte jakékoli pochybnosti o stavu svých jater, informujte svého lékaře.

Co je před léčbou, během léčby a po léčbě potřeba?

Pravidelně prováděné krevní testy

Před zahájením každého léčebného cyklu musíte podstoupit krevní testy, aby se zjistilo, jak Vaše játra fungují. V závislosti na výsledku těchto testů lékař rozhodne, zda je pro Vás léčba přípravkem Esmya vhodná.

Během léčby přípravkem Esmya Vám bude lékař pravidelně provádět krevní testy, aby tak zkontroloval funkci Vašich jater. Tyto testy se musí provádět každý měsíc a také několik týdnů poté, co dokončíte léčebný cyklus (viz rozpis níže). Z těchto krevních testů lékař zjistí informaci o funkci Vašich jater a testy jsou také naprosto nezbytnou součástí sledování Vaší léčby.

Tabulka níže vám pomůže sledovat provádění krevních testů:

	DATUM
1. TEST (před zahájením léčby)	
Zahájení léčby	
2. TEST (4 týdny po zahájení léčby)	
3. TEST (8 týdnů po zahájení léčby)	
4. TEST (12 týdnů po zahájení léčby)	
5. TEST (2–4 týdny po ukončení léčby přípravkem Esmya)	

Známky a příznaky možných problémů s játry

Pokud zaznamenáte kteroukoli z následujících známek nebo kterýkoli z následujících příznaků, ihned léčbu přerušte a kontaktujte lékaře:

- únava, slabost
- zežloutnutí kůže/bělma očí
- ztmavnutí moči
- bolest v pravé horní části břicha
- svědění
- nauzea (pocit na zvracení)
- zvracení

Lékař ihned provede vyšetření jater a rozhodne, zda můžete v léčbě pokračovat.

Tablety Esmya® 5 mg

Kartička pacientky

SK

Čo potrebujete vedieť
skôr, ako užijete
esmyu?

Esmya môže spôsobovať vedľajšie účinky, ktoré sa však nemusia objaviť u každého. Jedným z možných vedľajších účinkov je závažné poškodenie pečene. Táto kartička obsahuje informácie o krvných testoch, ktoré budete musieť v priebehu liečby podstúpiť, a o postupe v prípade rozvoja vedľajších účinkov spojených s pečeňou.

Neužívajte Esmyu, ak máte problémy s pečeňou.
Informujte svojho lekára, ak máte problémy s pečeňou alebo ak si nie ste istá stavom svojej pečene.

Čo robiť pred liečbou,
v jej priebehu a po
nej?

Podstupovať pravidelné krvné testy

Pred začatím každého liečebného cyklu budete musieť podstúpiť krvné testy s cieľom overiť funkciu vašej pečene. V závislosti od výsledku týchto testov sa lekár rozhodne, či je pre vás liečba Esmyou vhodná.

V priebehu liečby Esmyou bude váš lekár vykonávať pravidelné krvné testy, aby skontroloval funkciu vašej pečene. Tieto testy je nutné vykonávať každý mesiac a následne niekoľko týždňov po dokončení liečebného cyklu (pozri harmonogram nižšie). Tieto krvné testy ukážu lekárovi funkciu vašej pečene a sú pri sledovaní vašej liečby zásadné.

Tabuľka nižšie vám
pomôže sledovať vaše
krvné testy:

	DÁTUM
1. TEST (pred začatím liečby)	
Začatie liečby	
2. TEST (4 týždne po začatí liečby)	
3. TEST (8 týždňov po začatí liečby)	
4. TEST (12 týždňov po začatí liečby)	
5. TEST (2 – 4 týždne po ukončení liečby Esmyou)	

Známky a príznaky
možných problémov s
pečeňou

Ak spozorujete akékoľvek z nasledujúcich známkov alebo príznakov, ukončíte liečbu a ihneď sa obráťte na svojho lekára:

- vyčerpanosť, ťažká únava
- zožltnutie kože/očí
- tmavý moč
- bolesť v pravej hornej časti brucha
- svrbenie
- nevoľnosť
- vracanie

Lekár by mal ihneď skontrolovať vašu pečeň a rozhodnúť, či môžete pokračovať v liečbe.