

Deník bolesti

záznamová karta

Záznamová karta přípravku Fenroo

600 / 800 mikrogramů
4/28 bukálních tablet

Pravidelně užívané léky na bolest			Intenzita bolesti 1-10	
Název léku	Datum	Denní doba	Před lékem	Po léku

Škála intenzity bolesti od 0 (žádná) do 10 (nejhorší bolest)

Žádná bolest

Nejhorší bolest



[illegible]

Aplikovaná dávka Fenroo 600 / 800 µg - datum / čas / síla	Činnost, při které se průlomová bolest objevila	Místo bolesti na těle	Opakovaná dávka ano/ne; Pokud ano: čas
			Neužívejte opakovanou dávku 600 / 800 µg. Pro případ, že budete potřebovat opakovanou dávku, konzultujte předem její výši s lékařem.

Vedte si, prosím, záznam o tom, kdy a kolik tablet přípravku Fenroo jste použil(a). Pomůže to Vám i Vašemu lékaři ověřit správnost léčby.

Pokud Vám zbývají 4 a méně tablet, obraťte se, prosím, bez prodlení na Vašeho ošetřujícího lékaře tak, aby byla i nadále zajištěna dostatečná kontrola Vaší průlomové bolesti.

Je důležité, abyste používali přípravek Fenroo k léčbě maximálně 4 příhod průlomové bolesti denně. Jednotlivé příhody průlomové bolesti by neměly být léčeny více než 2 tabletami, které užijete po 30 minutách a pouze v případě, že první tableta nevedla k dostatečné úlevě bolesti.

Neužívejte opakovanou dávku ve výši 600/800 mikrogramů, poraďte se předem o výši opakované dávky s lékařem.