



INSTANYL DOSEGUAARD DOSEGUAARD®

KARTA PRO POČÍTÁNÍ DÁVEK

Je důležité, abyste měli přehled o tom, kolik dávek přípravku Instanyl DoseGuard DoseGuard® užíváte:

- ➔ *Není bezpečné používat přípravek Instanyl DoseGuard DoseGuard® pro léčbu více než 4 epizod průlomové bolesti během 24 hodin.*
- ➔ *S kartou pro počítání dávek budete vědět, kdy vám přípravek Instanyl DoseGuard® dochází, takže můžete požádat svého lékaře o nový předpis.*

Tato karta pro počítání dávek vám pomůže sledovat, kolik dávek užijete. Pokud nemůžete použít kartu pro počítání dávek, ujistěte se, že máte další písemný záznam o vašem použití přípravku Instanyl DoseGuard®. V případě potřeby požádejte o pomoc někoho z přátel nebo pečovatele. Pokud si nejste jisti, zda si dokážete vést záznamy sami, informujte o tom svého lékaře, lékárníka nebo jinou osobu, která o vás pečuje. Mohou vám pomoci najít způsob, jak použité dávky přípravku Instanyl DoseGuard® sledovat.

Karta pro počítání dávek se dodává spolu s nosním sprejem Instanyl DoseGuard®. Kartu pro počítání dávek naleznete v této příručce nebo na vyžádání na adrese: Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., Škrétova 12/490, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, Tel: + 420 731 620 870; Email: info-cz@takeda.com.

Pokud vám karta pro počítání dávek chybí, požádejte o ni svého lékaře nebo lékárníka.

Jak se karta pro počítání dávek používá?

1. Na obalu nosního spreje Instanyl DoseGuard® zkontrolujte, kolik dávek obsahuje.

Počet dávek může být různý a tato informaci je uvedena na krabičce a na štítku na lahvičce (viz obrázek vpravo).

2. Na kartě pro počítání dávek najděte odpovídající počet dávek a toto číslo zakroužkujte.

Pokud máte předepsáno balení
s obsahem 20 dávek, najděte na kartě
číslo 20 a zakroužkujte ho.

- 3.** Po každém užití dávky přípravku (jeden vstřík) zaznamenejte do tabulky datum a čas podání.

Poznámka: Jakmile se přiblížíte zakroužkovanému počtu dávek, můžete požádat svého lékaře o předepsání nového balení přípravku.

- 4.** S každým novým předepsaným balením přípravku použijte k zapisování novou kartu pro počítání dávek.



Příklad:

Datum a čas	1 4. dubna → 15:24	2 10. dubna 13:15	3 10. dubna 13:40	4 12. dubna 23:08	5 16. dubna 23:00	6	7	8	9	10
Datum a čas	11	12	13	14	15	16	17 Zavolejte lékaři	18	19	20
Datum a čas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Datum a čas	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

☑ Pokud vaše balení obsahuje **10 dávek**, tak zakroužkujte toto pole.

☛ Pokud vaše balení obsahuje **20 dávek**, tak zakroužkujte toto pole.

 Pokud vaše balení obsahuje **30 dávek**, tak zakroužkujte toto pole.

 Pokud vaše balení obsahuje **40 dávek**, tak zakroužkujte toto pole.

Datum a čas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datum a čas	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Datum a čas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Datum a čas	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

 Pokud vaše balení obsahuje **10 dávek**, tak zakroužkujte toto pole.

 Pokud vaše balení obsahuje **20 dávek**, tak zakroužkujte toto pole.

 Pokud vaše balení obsahuje **30 dávek**, tak zakroužkujte toto pole.

 Pokud
vaše balení
obsahuje
40 dávek, tak
zakroužkujte
toto pole.

Intranasal fentanyl SPRAY



INSTANYL[®]

Verze: 1
Schváleno SÚKL: 08/2023 • VV-MEDMAT-91503

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, Czech Republic