



Tuto kartu byste měli/a ukázat ošetřujícímu lékaři (především praktickému lékaři, kardiologovi a všem dalším lékařům specialistům, u kterých se léčíte). V případě, že vyhledáte ošetření na pohotovosti či v nemocnici – předložte kartu i lékaři na pohotovosti a ošetřujícímu lékaři v nemocnici. Uvedte zde seznam všech uzívaných léků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, ale i seznam volně prodejných léků, vitamínů i bylinných přípravků, které v současné době užíváte.

## Karta pacienta užívajícího přípravek TASIGNA

Přípravek TASIGNA prodlužuje srdeční komorovou repolarizaci, může způsobit prodloužení QT intervalu. Přípravek TASIGNA nemá být podáván s látkami, které jsou silnými inhibitory CYP3A4 (včetně, ale nejen, **ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu, klarithromycinu, telithromycinu, ritonaviru**) protože tyto inhibitory mohou zvýšit výskyt nežádoucích účinků léků, zvláště prodloužení QT intervalu.

Přípravek TASIGNA by měl být opatrně podáván pacientům užívajícím antiarytmika, jako jsou **amiodaron, disopyramid, prokainamid, chinidin a sotalol** nebo jiné léčivé látky, které mohou vést k prodloužení QT intervalu, např. **chlorochin, halofantrin, klarithromycin, haloperidol, methadon a morixoflacin**.



