

CZ PAR

Název (léčivá látka/přípravek)	
KETAMINUM	
Číslo procedury	
UK/W/0085/pdWS/001	
ART.	45
NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ	Ketalar
INN	Ketaminum
DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ	Pfizer
SCHVÁLENÉ INDIKACE	<p>Celková anestezie v monoterapii u krátkých diagnostických a terapeutických výkonů u pediatrické populace a u dospělých nebo v kombinaci s jinými anestetiky k indukci a udržování anestezie. Analgezie u akutních somatických bolestí traumatického původu, u popálenin (hlavně v přednemocniční péči), při bolestivých vyšetřeních a převazech. Dále se používá k bazálnímu útlumu během operace a bezprostředně v pooperační péči, v resuscitační péči a při hromadném výskytu zraněných.</p> <p>Další indikace: bronchospasmus rezistentní na běžnou terapii, adjuvantní léčba u astmatického stavu, úporná škytavka, priapismus.</p>
ATC KÓD	N01AX03
LÉKOVÁ FORMA, SÍLA	Injekční/infuzní roztok – 10 mg/ml, 50 mg/ml, 100 mg/ml
INDIKAČNÍ SKUPINA	05
ZMĚNA V SmPC	Ano (4.1)
ZMĚNA V PIL	Ne

DOPORUČENÍ (úprava znění příslušného bodu SmPC)

SmPC

4.1 Terapeutické indikace

Ketamin je indikován pro dospělé, dospívající a děti.