

Riziko krevních sraženin v žilách nebo plicích

Litfulo může způsobovat vznik krevních sraženin v žilách (žíly dolních končetin, v plicích) nebo tepnách (v oku, v srdci). Neprodleně informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví některý z následujících příznaků:

- bolestivý otok dolní končetiny
- bolest na hrudi
- dušnost
- akutní změny vidění (rozmazané vidění, částečnou nebo úplnou ztrátu zraku)
- náhlé ochrnutí jedné strany těla – například bezdůvodný mimovolný pokles paže, koutků úst, nebo náhlé problémy při vstávání
- náhlé poruchy řeči

Riziko neurologických příznaků

Poradte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže se během užívání přípravku Litfulo objeví neobjasněné příznaky způsobené nějakým problémem s nervovou soustavou, např. poruchy sluchu.

Antikoncepce a těhotenství

Přípravek Litfulo se NESMÍ v těhotenství podávat.

Jestliže jste žena v plodném věku, musíte během léčby a ještě nejméně po dobu jednoho měsíce po poslední dávce přípravku Litfulo používat účinnou metodu antikoncepce.

O dostupných metodách antikoncepce se poradte se svým lékařem.

Pokud během léčby otěhotníte nebo se budete domnívat, že jste mohla otěhotnět, sdělte to okamžitě svému lékaři, protože přípravek Litfulo může poškodit vývoj dítěte.

Litfulo (ritlecitinib) – KARTA PACIENTA

Tuto kartu noste u sebe a ukažte ji každému zdravotnickému pracovníkovi, který se podílí na Vaší zdravotní péči, například lékárníkovi nebo lékaři na pohotovosti.

Vaše jméno:

Jméno lékaře (který Vám předepsal přípravek Litfulo):

Telefonní číslo lékaře:

Datum zahájení léčby přípravkem Litfulo:



Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>.

Co je přípravek Litfulo a k čemu se používá Přípravek Litfulo obsahuje léčivou látku ritlecitinib, který snižuje aktivitu enzymů, které se podílejí na zánětu vlasových váčků u závažné ložiskové plešatosti. Zmírněním zánětu následně dochází k obnovení růstu vlasů. Je třeba, abyste věděl(a) o určitých nežádoucích účincích a níže uvedených tématech. Více informací se dočtete v příbalové informaci pro pacienty, která je součástí každého balení přípravku Litfulo.	Riziko infekcí Před léčbou a během léčby přípravkem Litfulo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: – máte infekci (případnými známkami mohou být horečka, pocení, třesavka, bolesti svalů, kašel, dušnost, krev v hlenech, úbytek tělesné hmotnosti, průjem, bolest břicha, pálení při močení, častější močení než obvykle, pocit velké únavy); – máte nebo jste měl(a) tuberkulózu nebo jste byl(a) v blízkém kontaktu s osobou, která má tuberkulózu, nebo jste tyto oblasti navštívil(a). Lékař Vám před zahájením léčby přípravkem Litfulo provede test na tuberkulózu a během léčby může test zopakovat; – jste někdy měl(a) herpetickou infekci (například plané neštovice nebo pásový opar), protože přípravek Litfulo může způsobit, že se tato infekce vrátí. Informujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví bolestivá kožní vyrážka s puchýřky, protože by se mohlo jednat o známku pásového oparu.	Očkování Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže jste nedávno byl(a) očkovan(a) nebo se plánujete nechat očkovat, protože určité živé vakcíny např. vakcína proti spalničkám, příušnicím, dětské obrně, TBC, žluté zimnici apod.) se bezprostředně před léčbou a během užívání přípravku Litfulo nedoporučují. Riziko nádorového onemocnění – Stále probíhá hodnocení rizika nádorového onemocnění při užívání přípravku Litfulo. – Pokud máte nebo jste měl(a) nějaké nádorové onemocnění rozhodne lékař, zda je pro Vás léčba přípravkem Litfulo vhodná. – Pokud je u Vás zvýšené riziko nádorového onemocnění kůže, jsou doporučeny pravidelné kontroly kůže. – V případě zjištění jakýchkoliv nových změn na kůži kontaktujte svého lékaře.
--	--	--