

EDUKAČNÍ MATERIÁLY

Ujistěte se, že jste vybral(a) správnou lékovou formu a sílu přípravku MabThera®

SUBKUTÁNNÍ INJEKCE

MabThera 1400 mg
POUZE PRO POUŽITÍ U NHL*



Růžové odlamovací
víčko

Odeberte přímo z injekční lahvičky a
podávejte subkutánní injekcí



Před použitím zkontrolujte specifické charakteristiky balení
přípravku MabThera:

Červený štítek: „**Pouze k subkutánnímu podání**“, „**roztok
pro subkutánní injekci**“ a „**s.c.**“

INTRAVENÓZNÍ INFUZE

MabThera 100 mg koncentrát pro infuzní roztok
MabThera 500 mg koncentrát pro infuzní roztok
Pro použití u všech schválených indikací přípravku
MabThera*



**Naředte 0,9% roztokem NaCl nebo 5%
roztokem glukózy a podávejte intravenózní
infuzí**

* NHL = ne Hodgkinův lymfom.

Přípravek MabThera s.c. není indikován jako monoterapie u pacientů s folikulárním lymfomem ve stadiu III-IV, kteří jsou rezistentní k chemoterapii nebo prodělávají druhý nebo další následný relaps po chemoterapii.

Máte-li jakékoli další otázky, nahlédněte do Souhrnu údajů o přípravku nebo kontaktujte společnost Roche s.r.o., Praha, Česká republika
Tel.: +420 220 382 111; e-mail: prague.info@roche.com

Použijte odlepovací část štítku, abyste se ujistil(a), že svému pacientovi podáváte správnou lékovou formu a sílu, jak je ukázáno níže

**MabThera 1 400 mg roztok pro subkutánní injekci
POUŽIJTE POUZE U NHL**



1. Štítek na lahvičce přípravku MabThera



2. Odstraňte odlepovací část



3. Nalepte odlepovací část na injekční stříkačku