



increlex[®]

Návod k použití

Tento leták je rychlým návodem
k přípravě a podání injekce
přípravku Increlex[®]



* increlex® – návod k použití

Increlex® by měl být aplikován s použitím sterilních jednorázových stříkaček a jehel

Příprava dávky

1. Umyjte si ruce.


Předtím, než začnete s přípravou injekce Increlexu, si umyjte ruce.

2. Použijte novou jehlu a stříkačku

Pro každou dávku přípravku použijte novou jehlu a stříkačku.


3. Příprava stříkačky

Zkontrolujte, zda je tekutina čirá a bezbarvá – **nepoužívejte ji**, jestliže je zakalená, nebo jestliže jsou v ní viditelné částečky a také jestliže je prošlé datum spotřeby. Jestliže použijete novou ampulku, sejměte ochranné víčko, ale ponechte gumovou zátku, která by měla být omyta alkoholovým čtverečkem tak, aby se zabránilo kontaminaci.




4. Vstříkněte do ampulky vzduch

Předtím, než vpichnete do ampulky jehlu, nasajte do stříkačky vzduch, jehož množství odpovídá dávce Increlexu. Vsuňte jehlu přes gumovou zátku do ampulky a tlakem na píst stříkačky vtlačte dovnitř připravený vzduch.




5. Nasátí dávky

Ponechte stříkačku s jehlou v ampulce a otočte ampulku se stříkačkou dnem vzhůru. Ampulku a stříkačku držte pevně. Ujistěte se, že je hrot jehly ponořen v roztoku a poté tahem za píst stříkačky natáhněte příslušnou dávku.



6. Odstraňte bubliny a naplňte stříkačku

Předtím, než vytáhnete jehlu z ampulky, zkontrolujte, zda stříkačka neobsahuje vzduchové bubliny. Jestliže ano, podržte ampulku se stříkačkou dnem vzhůru a klepáním na stěnu stříkačky přemístěte bubliny do jejího vrcholu. Poté pomocí pístu vytlačte bubliny ven. Potom natáhněte chybějící objem roztoku, dokud stříkačka neobsahuje požadovanou dávku.



7. Příprava k injekční aplikaci


Vyjměte jehlu z ampulky. Jehlou se ničeho nedotýkejte. Nyní je stříkačka připravena k aplikaci.


Injekční aplikace dávky:

Aplikujte Increlex® podle pokynů Vašeho lékaře. Injekci nepodávejte, jestliže se Vaše dítě není schopno 20 minut před nebo po aplikaci najíst.

8. Zvolte místa injekce

Rozhodněte se, kam podáte injekci – horní paže, stehno, hýždě nebo břicho (viz obrázek). Místo vpichu by mělo být při každé aplikaci jiné.






9. Injekce dávky

V místě, kam budete aplikovat injekci, očistěte kůži Vašeho dítěte alkoholem nebo mýdlem a vodou. Místo injekce by mělo být před aplikací suché.

Dvěma prsty lehce nařazte kůži. Vpíchněte jehlu tak, jak Vám dříve ukázal Váš dětský lékař. Kůži uvolněte.

Pomalu zatlačte na píst stříkačky po celé její délce tak, dokud ji zcela nevyprázdníte.



10. Jehlu vyjměte tahem přímo vzhůru a lehce stiskněte (netřete) místo čtverečkem nebo vatou

Jehlu vyjměte tahem přímo vzhůru a lehce na několik sekund stlačte místo aplikace čtverečkem nebo smotkem vaty.

Místo vpichu netřete!

Stiskněte (netřete) čtverečkem nebo vatou. Na stříkačku nevracejte víčko. Použité jehly a stříkačky by měly být umístěny do obalu na ostré předměty, který by měl být správně uzavřen a zlikvidován.



* Increlex® by se měl aplikovat **dvakrát denně**



* Increlex® by se měl aplikovat krátce před nebo **krátce po jídle**



* Pokud nemůže být dávka Increlexu aplikována krátce před nebo krátce po jídle, musí být tato dávka vynechána



* Každou dávku aplikujte na kůži **na jiné místo**



* Jestliže dojde k vynechání dávky, následující dávka Increlexu se nikdy nesmí zvyšovat, aby nahradila jednu nebo více vynechaných dávek. Následující dávka by měla být aplikována v obvyklou dobu

2°C - 8°C



* Increlex® se uchovává v lednici, ale NESMÍ zmraznout



Pro získání dalších informací si, prosím, přečtěte příbalový leták, který naleznete v krabičce s lékem nebo se poradte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.



Pro další informace se můžete také obrátit na adresu:

Ipsen Pharma
Evropská 136, 160 00 Praha 6
tel.: 242 481 821, fax: 242 481 828
e-mail: info@ipsen.cz
www.ipsen.cz
www.poruchy-rustu.cz

