

REBLOZYL® (luspatercept)

Karta pacientky

Informace pro pacientky v plodném věku

REBLOZYL (luspatercept) se nesmí používat během těhotenství a 3 měsíce před otěhotněním. REBLOZYL může mít škodlivý vliv na Vaše nenarozené dítě.

- Nepoužívejte REBLOZYL pokud jste těhotná nebo kojíte, nebo byste mohla otěhotnět a nepoužíváte účinnou antikoncepci.
- Před zahájením léčby přípravkem REBLOZYL musíte mít negativní těhotenský test potvrzený lékařem. Těhotenský test se musí v průběhu léčby pravidelně opakovat.
- Musíte se poradit se svým lékařem o účinných antikoncepčních metodách, které je nutno používat během léčby přípravkem REBLOZYL a ještě nejméně 3 měsíce po podání poslední dávky
- Pokud v průběhu léčby přípravkem REBLOZYL nebo během následujících 3 měsíců po ukončení jeho podávání zjistíte, že jste těhotná, nebo budete mít podezření, že jste otěhotněla, okamžitě informujte svého lékaře.
- Kontaktní informace na předepisujícího lékaře najdete na zadní straně této karty.
- Další informace o přípravku REBLOZYL včetně informací o jeho možných nežádoucích účincích naleznete v Příbalové informaci přípravku REBLOZYL.
- V případě potřeby si vyžádejte novou Kartou pacientky od lékaře, který vám REBOZYL předepsal.

Důležité kontaktní informace

Lékař, který mi předepsal léčivý přípravek
REBLOZYL:

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

Adresa pracoviště: