

#### Ostatní informace

Jméno pacienta

Jméno lékaře

Tel. kontakt na lékaře

**Tato karta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které potřebujete vědět před léčbou přípravkem SIMPONI® i v jejím průběhu.**

**Ukažte tuto kartu každému lékaři, který Vás léčí.**



Merck Sharp & Dohme s.r.o.,  
Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6  
Česká republika

11-154451-110269/4005

**KARTA S UPOZORNĚNÍM  
PRO PACIENTA  
K PŘÍPRAVKU**

  
**Simponi®**  
golimumab

#### 3. Data, kdy Vám byl přípravek SIMPONI® (golimumab) podán:

První podání:

/ /

Následné podání:

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

#### 4. Další informace:

Dbejte prosím na to, abyste při každé návštěvě lékaře u sebe měl(a) seznam všech dalších léků, které užíváte.

Noste tuto kartu u sebe po celou dobu léčby přípravkem SIMPONI® a následně po dobu 6 měsíců po poslední dávce, protože nežádoucí účinky se mohou objevit dlouho po Vaší poslední dávce přípravku SIMPONI®.

Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci k přípravku SIMPONI® před tím, než začnete tento lék užívat.

## Infekce

Pokud se léčíte přípravkem SIMPONI<sup>®</sup>, můžete se snadněji nakazit infekcemi. Infekce mohou postupovat rychleji a mohou být závažnější. Navíc se mohou znovu objevit některé již dříve prodělané infekce.

### 1.1. Před zahájením léčby přípravkem SIMPONI<sup>®</sup>:

- Informujte svého lékaře, pokud máte nějakou infekci. Přípravkem SIMPONI<sup>®</sup> nesmíte být léčen(a), pokud trpíte tuberkulózou (TBC) nebo jinou závažnou infekcí.

- Měl(a) byste podstoupit vyšetření na TBC. Je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud jste někdy v minulosti trpěl(a) TBC nebo pokud jste byl(a) v těsném kontaktu s někým, kdo měl TBC.

**Požádejte svého lékaře, aby níže zaznamenal druh a datum posledního/posledních vyšetření na TBC:**

Druh vyšetření: Datum / /

Druh vyšetření: Datum / /

Druh vyšetření: Datum / /

Druh vyšetření: Datum / /

- Informujte svého lékaře, pokud víte nebo máte podezření, že jste nositelem viru hepatitidy B.

### 1.2. V průběhu a po ukončení léčby přípravkem SIMPONI<sup>®</sup> (golimumab):

- Neprodleně vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky infekce, například horečka, únava, (přetrvávající) kašel, dušnost nebo chřipkové příznaky, úbytek tělesné hmotnosti, noční pocení, průjem, rány, problémy se zuby a pocit pálení při močení.

## 2. Srdeční selhání

### 2.1. Před léčbou přípravkem SIMPONI<sup>®</sup> (golimumab):

- Informujte svého lékaře, pokud jste měl(a) v minulosti srdeční selhání. Pokud trpíte středně těžkým až těžkým srdečním selháním, nesmíte být přípravkem SIMPONI<sup>®</sup> léčen(a).

### 2.2. V průběhu a po ukončení léčby SIMPONI<sup>®</sup> (golimumab):

- Pokud se u Vás objeví příznaky srdečního selhání (např. dušnost nebo otoky nohou), vyhledejte ihned lékaře.