

Mé jméno:

Mé telefonní číslo:

Kontakt pro případ nouze:

Telefonní číslo pro případ nouze:

Jméno hematologa / onkologa /
sestry na onkologii:

Telefonní číslo:

Telefonní číslo mimo ordinaci
hodiny:

Název mé nemocnice:

Telefonní číslo na moji nemocnici:

KARTA PACIENTA

XOSPATA™ (gilteritinibum)

- Tuto kartu noste **vždy** při sobě, zejména pokud cestujete nebo navštívíte-li jiného lékaře.
- Tuto kartu předložte každému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře při každém lékařském ošetření nebo při jakékoli návštěvě nemocnice nebo kliniky.
- Objeví-li se u Vás jakékoli nežádoucí účinky, zejména ty, které jsou uvedeny na této kartě, **neprodleně** se obraťte na svého lékaře.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO PACIENTY

Přípravek Xospata může způsobovat závažné nežádoucí účinky včetně diferenciačního syndromu.

Diferenciační syndrom je stav, který ovlivňuje krvinky a může být život ohrožující nebo smrtelný, není-li včas léčen.

Vyskytnou-li se u Vás některé z níže uvedených příznaků, **neprodleně** se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru:

- horečka
- dýchací potíže
- vyrážka
- závrať nebo malátnost
- rychlý přírůstek hmotnosti
- otoky paží nebo nohou.

Diferenciační syndrom se může vyskytnout kdykoli během prvních 3 měsíců léčby již 1 den po jejím zahájení. Včasné nasazení léčby může zabránit zhoršení problému.

Lékař může sledovat Váš zdravotní stav, přerušit Vaši léčbu a/nebo Vám podat lék k léčbě Vašich obtíží. Máte-li jakékoli další otázky týkající se Vaší léčby, obraťte se na svého lékaře.

Tento přehled nežádoucích účinků není úplný a je třeba se seznámit i s možnými dalšími nežádoucími účinky, jejichž výčet naleznete v Příbalové Informaci pro pacienta.

Příbalová informace pro pacienta (PIL) je distribuována v každém balení léčivého přípravku a lze ji také vyhledat na <http://www.olecich.cz> po zadání názvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

- Tento pacient je léčen přípravkem Xospata (gilteritinibum), který může způsobit diferenciační syndrom.
- Příznaky diferenciačního syndromu zahrnují horečku, dyspnoe, pleurální výpotek, perikardiální výpotek, plicní edém, hypotenzi, rychlý přírůstek hmotnosti, periferní otok, vyrážku a renální dysfunkci.
- Existuje-li podezření na diferenciační syndrom, je nutné zahájit terapii kortikosteroidy spolu s hemodynamickým monitorováním, dokud příznaky neodezní.
- Přetrvávají-li závažné známky a/nebo příznaky déle než 48 hodin od zahájení podávání kortikosteroidů, je nutné přerušit léčbu přípravkem Xospata až do zmírnění známek a/nebo příznaků.

Požádejte hematologa/onkologa pacienta o další informace a přečtěte si informace o gilteritinibu, které jsou k dispozici na adrese <https://www.ema.europa.eu/>.

163484

