

Karta pacienta o osteonekróze čelisti (ONJ) a léčbě denosumabem

U pacientů léčených denosumabem byl hlášen nežádoucí účinek osteonekróza čelisti (poškození čelistní kosti, ONJ), který se může vyskytnout i po ukončení léčby. Je důležité se pokusit vzniku ONJ zabránit, může být bolestivá a její léčba může být složitá. Proto **dodržujte preventivní opatření** uvedená na druhé straně karty.

Vyšší riziko vzniku ONJ mají pacienti se špatnou zubní hygienou nebo nenavštěvující pravidelně zubaře; s onemocněním zubů anebo jinými potížemi v ústní dutině; podstupující stomatochirurgické zákroky (např. trhání zubu), kuřáci, dříve léčení bisfosfonáty, užívající kortikosteroidy, pacienti podstupující souběžnou onkologickou léčbu (včetně radioterapie hlavy a krku).

Schváleno SÚKL 07/2025 <https://sukl.gov.cz/edukacni-materialy>

PŘED ZAHÁJENÍM LÉČBY

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, zejména pokud **máte potíže se zuby nebo v ústní dutině** a/nebo **se chystáte podstoupit stomatochirurgický zákrok**.

Zeptejte se lékaře, zda Vám před léčbou doporučí zubní prohlídku.

BĚHEM LÉČBY A PO NÍ:

- **Udržujte dobrou zubní hygienu a chodte na pravidelné zubní prohlídky.** Pokud máte zubní protézu, ujistěte se, že dobře sedí.
- Jestliže jste léčeni u zubaře nebo pokud se chystáte podstoupit stomatochirurgický zákrok (např. vytržení zubu), informujte o tom svého lékaře a **informujte svého zubaře o léčbě denosumabem**.
- **Kontaktujte ihned svého lékaře a zubaře**, když se vyskytne **jakýkoliv problém v ústní dutině** (jako např. vypadávání zubů, bolest nebo otok nebo nehojící se rány či výtok, protože se může jednat o příznaky osteonekrózy čelisti).