

EZICLEN®

koncentrát pro perorální roztok

Natrii sulfas, magnesii sulfas a kalii sulfas

Lékař:

Datum:

Příchod v:

Místo:

Režim podání:

☐ JEDNODENNÍ PLÁN:
Obě dávky den PŘED zákrokem

☐ DVOUDENNÍ PLÁN (S ROZDĚLENOU DÁVKOU):
1. dávka den PŘED zákrokem;
2. dávka v den zákroku

► DŮLEŽITOST DOSTATEČNÉ HYDRATACE

Protože průjem způsobuje dehydrataci, je velice důležité, abyste striktně dodrželi níže uvedené pokyny a vypili tolik dalších tekutin, kolik je nezbytné k udržení dostatečné hydratace.



Můžete pít kteroukoli z následujících čirých tekutin:

Čiré tekutiny jako voda, čaj nebo káva (bez mléka nebo smetany bez obsahu mléka), nealkoholické nápoje bez červeného či fialového zbarvení (perlivé či neperlivé). Jsou povoleny slazené nápoje; perlivé či neperlivé nealkoholické nápoje, ovocné šťávy (**bez obsahu** dužiny), bujóny nebo čiré polévky nebo polévky scezené, zbavené jakýchkoli pevných částic.



NEPIJTE:

Mléko, červeně či fialově zbarvené nápoje, alkoholické nápoje, ovocné šťávy nebo nápoje **s** dužinou.

JAK SE PŘIPRAVIT NA ZÁKROK

Pro zajištění efektivního vyčištění střev a tím i úspěšného zákroku je nezbytné, abyste striktně dodrželi následující instrukce. Den před zákrokem si můžete dát lehkou snídani; poté již přijímejte **POUZE** čiré tekutiny namísto oběda, večeře či jakéhokoli jiného jídla a to až do provedení zákroku.

JAK UŽÍT EZICLEN®?

Příprava s přípravkem Eziclen® spočívá v užití 2 dávek následujícím způsobem:

datum		začátek podání:	
► 1. dávky:			
1.hodina	 Nalijte obsah jedné lahve přípravku Eziclen® do odměrky.	 Přidejte k přípravku tolik vody , aby hladina dosáhla rysky na odměrce.	 Během následující půl hodiny až hodiny vypijte veškerý roztok z odměrky.
2.hodina	 DŮLEŽITÉ V průběhu následující hodiny postupně vypijte další 2 odměrky naplněné vodou (nebo jinou čirou tekutinou).		
► datum		začátek podání:	
2. dávky:			
1.hodina	 Nalijte obsah druhé lahve přípravku Eziclen® do odměrky.	 Přidejte k přípravku tolik vody , aby hladina dosáhla rysky na odměrce.	 Během následující půl hodiny až hodiny vypijte veškerý roztok z odměrky.
2.hodina	 DŮLEŽITÉ V průběhu následující hodiny postupně vypijte další 2 odměrky naplněné vodou (nebo jinou čirou tekutinou).		

Poznámka:

- V případě, že nebude provedena anestezie, musíte ukončit příjem veškerých tekutin nejméně jednu hodinu před začátkem zákroku.
- V případě, že bude provedena anestezie, musíte ukončit příjem veškerých tekutin obvykle nejméně 2 hodiny před začátkem zákroku, podle pokynů anesteziologa.

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ CELOU PŘÍBALOVOU INFORMACI DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE TENTO PŘÍPRAVEK UŽÍVAT

Nezapomeňte vyplnit tento formulář a přinést jej v den zákroku zpět Vašemu lékaři.

Níže uvedená tabulka vám pomůže kontrolovat, že postupujete správně podle instrukcí a zajistit tak kvalitní přípravu. Zaznamenejte, prosím, datum podání přípravku a čas jednotlivých podání uvedených v tabulce.

Měl/a byste vypít všechny přípravek a doplňující tekutiny.

► Datum 1.DÁVKY:		
KROK		ČAS PODÁNÍ
Začátek léčby: KROKY 1 – 3 Nalijte obsah jedné lahve přípravku Eziclen® do odměrky a přidejte tolik vody , aby hladina dosáhla rysky na odměrce.	  	Čas podání první dávky naředěného přípravku Eziclen®:
Podání doplňující vody nebo jiné čiré tekutiny: KROK 4 2x odměrka naplněná vodou nebo jinou povolenou čirou tekutinou		Čas podání první odměrky s vodou (nebo jinou čirou tekutinou): Čas podání druhé odměrky s vodou (nebo jinou čirou tekutinou):

VYPIL(A) JSTE VŠECHEN PŘÍPRAVEK?	
☐ Ano ☐ Ne	
Pokud NE , uveďte přibližné vypité množství:	
Čiré tekutiny, které zajistí vaši dostatečnou hydrataci	
DRUH POUŽITÉ TEKUTINY	VYPIL(A) JSTE CELÝ OBSAH ODMĚRKY?
První odměrka	☐ Ano ☐ Ne Pokud NE , uveďte přibližné vypité množství:
Druhá odměrka	☐ Ano ☐ Ne Pokud NE , uveďte přibližné vypité množství:

► Datum 2.DÁVKY:		
KROK		ČAS PODÁNÍ
Druhá část léčby: ZOPAKUJTE KROKY 1 - 3 Nalijte obsah druhé lahve přípravku Eziclen® do odměrky a přidejte tolik vody , aby hladina dosáhla rysky na odměrce.	  	Čas podání druhé dávky naředěného přípravku Eziclen®:
Podání doplňující vody nebo jiné čiré tekutiny: KROK 4 2x odměrka naplněná vodou nebo jinou povolenou čirou tekutinou		Čas podání první odměrky s vodou (nebo jinou čirou tekutinou): Čas podání druhé odměrky s vodou (nebo jinou čirou tekutinou):

VYPIL(A) JSTE VŠECHEN PŘÍPRAVEK?	
☐ Ano ☐ Ne	
Pokud NE , uveďte přibližné vypité množství:	
Čiré tekutiny, které zajistí vaši dostatečnou hydrataci	
DRUH POUŽITÉ TEKUTINY	VYPIL(A) JSTE CELÝ OBSAH ODMĚRKY?
První odměrka	☐ Ano ☐ Ne Pokud NE , uveďte přibližné vypité množství:
Druhá odměrka	☐ Ano ☐ Ne Pokud NE , uveďte přibližné vypité množství:

Po zákroku: Abyste nahradil(a) tekutinu ztracenou během přípravy na zákrok, vypijte dostatečné množství tekutin, aby byla zachována dostatečná hydratace.