

Důležité informace o přípravku ILARIS[®] (kanakinumab) podkožní injekce 150 mg

Léčba syndromů periodických horeček včetně:
Periodických syndromů asociovaných s kryopyrinem (CAPS)
Periodický syndromů asociovaných s receptorem
pro tumor nekrotizující faktor (TRAPS)
Syndromu hyperimmunoglobulinemie D (HIDS)/
deficit mevalonátkinázy (MKD)
Familiární středomořská horečka (FMF)

Před zahájením léčby kanakinumabem:

- **Infekce:** Kanakinumabem byste neměl/a být léčen/a, pokud máte aktivní infekci vyžadující lékařský zásah.
- **Očkování:** Promluvte si se svým lékařem o veškerých očkováních, která máte absolvovat před zahájením léčby kanakinumabem.

V průběhu léčby kanakinumabem:

- **Riziko infekce:** Užívání kanakinumabu je spojené s vyšším rizikem infekce, včetně závažných infekcí.
- Pokud se u Vás objeví infekce, může být nutné léčbu kanakinumabem přerušit. Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud máte horečku trvající déle než 3 dny nebo jiné příznaky, které mohou být způsobeny infekcí.
- Vyhledejte **okamžitě** lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou:
 - déletrvající horečka, kašel nebo bolesti hlavy nebo
 - místní zarudnutí, teplo nebo otok kůže nebo
 - přetrvávající kašel, ztráta hmotnosti nebo zvýšená tělesná teplota.
- **Těhotenství:** Pokud jste užívala kanakinumab v průběhu těhotenství, je důležité, abyste o tom informovala dětského lékaře nebo zdravotní sestru před jakýmkoliv očkováním Vašeho dítěte. Vaše dítě nesmí být očkováno živou vakcínou po dobu nejméně 16 týdnů po Vaší poslední dávce kanakinumabu před porodem.

Léčba:

Ujistěte se, prosím, že při návštěvě zdravotnického zařízení máte u sebe seznam všech léků, které užíváte

Jméno pacienta: _____

U dětí: jméno rodiče/opatrovatele: _____

Datum první dávky kanakinumabu: _____

Množství podané dávky kanakinumabu: _____

Jméno lékaře: _____

Telefon lékaře: _____

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete na:

sukl.gov.cz/nezadouciucinky

Adresa pro zasilání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance
Šrobárova 49/48, Praha 10, 100 00
e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz

Tato informace může být také hlášena společnosti Novartis na adresu:

Novartis s.r.o., Gemini, budova B
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Tel: 225 775 111
email: safety.cz@novartis.com

CZ/FA-11525089/10/2025

Verze: 2
Schváleno SUKL: 10/2025