

REBLOZYL® (Iuspatercept)

Karta pacientky

INFORMACE PRO PACIENTKY V PLODNÉM VĚKU

REBLOZYL (Iuspatercept) se nesmí používat během těhotenství a 3 měsíce před otěhotněním. REBLOZYL může mít škodlivý vliv na Vaše nenarozené dítě.

- Nepoužívejte REBLOZYL, pokud jste těhotná nebo kojíte, nebo byste mohla otěhotnět a nepoužíváte účinnou antikoncepci.
- Před zahájením léčby přípravkem REBLOZYL musíte mít negativní těhotenský test potvrzený lékařem. Těhotenský test se musí v průběhu léčby pravidelně opakovat.
- Musíte se poradit se svým lékařem o účinných antikoncepčních metodách, které je nutno používat během léčby přípravkem REBLOZYL a ještě nejméně 3 měsíce po podání poslední dávky.

- Pokud v průběhu léčby přípravkem REBLOZYL nebo během následujících 3 měsíců po ukončení jeho podávání zjistíte, že jste těhotná, nebo budete mít podezření, že jste otěhotněla, okamžitě informujte svého lékaře.
- Kontaktní informace na předepisujícího lékaře najdete níže.
- Další informace o přípravku REBLOZYL, včetně informací o jeho možných nežádoucích účincích, naleznete v Příbalové informaci přípravku REBLOZYL.
- V případě potřeby si vyžádejte novou Kartu pacientky od lékaře, který vám REBLOZYL předepsal.

Důležité kontaktní informace

Lékař, který mi předepsal léčivý přípravek REBLOZYL:
Jméno a příjmení:

.....

Telefonní číslo:

.....

Adresa pracoviště:

.....