

LIVMARLI (maralixibat)

PRŮVODCE ÚPRAVOU DÁVKOVÁNÍ PŘÍPRAVKU LIVMARLI PŘI LÉČBĚ PFIC PODLE ZVYŠUJÍCÍ SE TĚLESNÉ HMOTNOSTI

Tato brožura je určena pacientům, kterým byl předepsán přípravek LIVMARLI® k léčbě PFIC (progresivní familiární intrahepatální cholestázy), a jejich rodičům nebo opatrovatelům. Předepisující lékař do ní bude zaznamenávat pacientovu hmotnost, vypočítanou dávku a objem a velikost injekční stříkačky. Vyplněnou brožuru pak předá pacientovi/opatrovateli. Cílem je zajistit bezpečné a účinné užívání přípravku Livmarli a řádné zvládnutí významného potenciálního rizika chybného dávkování. **Přípravek LIVMARLI® je indikován k léčbě progresivní familiární intrahepatální cholestázy (PFIC) u pacientů ve věku 3 měsíců a starších.**



Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete na: <https://nezadouciucinky.sukl.cz/>

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 49/48, Praha 10, 100 00, email: farmakovigilance@sukl.gov.cz.

JMÉNO PACIENTA:

DATUM NAROZENÍ:

DATUM ZAHÁJENÍ LÉČBY:

JMÉNO LÉKAŘE:

Tuto tabulku vyplňují pouze zdravotničtí pracovníci:

Datum zahájení	Datum ukončení	Hmotnost (kg)	Dávka přípravku Livmarli®	Objem podávaného přípravku (ml) a četnost podávání (jednou denně nebo dvakrát denně)	Velikost používané injekční stříkačky (0,5 ml / 1 ml / 3 ml)

KDE MOHU ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE?

Informace k přípravku Livmarli najdete v Příbalové Informaci pro pacienta (PIL), která je distribuována v každém balení léčivého přípravku a lze jí také vyhledat v databázi léčiv na (<https://sukl.gov.cz/>) po zadání názvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL. **Před zahájením léčby je důležité, abyste si Vy nebo Vaše dítě příbalovou informaci přečetli.**

Budete-li mít dotazy týkající se přípravku LIVMARLI nebo progresivní familiární intrahepatální cholestázy (PFIC), obraťte se na svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka.

Verze: 1

Schváleno SÚKL: 09/2025