

Vaše jméno:

.....

.....

Pokud používáte přípravek Jyseleca, noste tuto kartu neustále při sobě a ukažte ji každému zdravotnickému pracovníkovi, který se podílí na vaší lékařské péči, například i lékaři na pohotovosti, nebo lékárníkovi.

Karta pacienta

Tuto kartu mějte neustále u sebe

Jméno lékaře

(který přípravek Jyseleca předepsal):

.....

.....

Telefon na lékaře:

.....

**Informace o bezpečnosti
léčivého přípravku
JYSELECA® (filgotinib)
pro pacienty**

**Datum zahájení léčby
přípravkem Jyseleca:**

.....

Verze 3 / Schválená SÚKL 7.8.2025

NP-43298

Tato karta pacienta obsahuje důležité informace o bezpečnosti léčivého přípravku Jyseleca. Přečtěte si prosím příbalovou informaci, kde získáte více informací.

Infekce

- Přípravek Jyseleca může zhoršit stávající infekci nebo zvýšit pravděpodobnost onemocnění novou infekcí. Ihned informujte svého lékaře, jestliže se u Vás rozvinou příznaky infekce jako například:
 - horečka nebo zimnice, dušnost, kašel, pocit větší únavy než obvykle – může se jednat o příznaky zápalu plic,
 - horečka, pocení, úbytek tělesné hmotnosti nebo přetrvávající kašel – může se jednat o příznaky tuberkulózy (TBC),
 - bolestivá kožní vyrážka s puchýři – může se jednat o příznaky pásového oparu (herpes zoster)
- Před začátkem léčby přípravkem Jyseleca se poraďte se svým lékařem, zda máte být otestován(a) na přítomnost TBC, včetně latentní (němé) infekce.
- Pokud jste v poslední době byl(a) v úzkém kontaktu s nemocným s TBC, informujte svého lékaře.

Maligní nádorové onemocnění a maligní nemelanomové kožní nádorové onemocnění

- Přípravek Jyseleca může vést ke zvýšenému riziku rakoviny. Pokud na kůži objevíte nový výrůstek, sdělte to svému lékaři.

Krevní sraženiny v žilách nebo plicích

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví známky krevních sraženin v žilách dolních končetin nebo plicích, jako jsou bolestivé otoky nohou, bolest na hrudi nebo dušnost.

Cholesterol

Vysoký cholesterol je významným rizikovým faktorem pro onemocnění srdce. Během užívání přípravku Jyseleca Vám bude lékař kontrolovat hladinu cholesterolu. To pomůže rozhodnout, zda potřebujete léčbu ke snížení hladiny cholesterolu.

Očkování

- Během léčby přípravkem Jyseleca nebo bezprostředně před ní se nedoporučuje použití tzv. živých vakcín (například ZostavaxTM používaný k prevenci pásového oparu).
- Před zahájením léčby přípravkem Jyseleca se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem o Vašich očkováních, aby bylo zajištěno, že všechna Vaše očkování jsou v souladu s aktuálními doporučeními.

Těhotenství, antikoncepce a kojení

Přípravek Jyseleca se nesmí užívat v těhotenství:

- Během užívání přípravku Jyseleca a nejméně 1 týden poté, co si vezmete svou poslední dávku, musíte používat účinnou antikoncepci.
- Pokud během užívání přípravku Jyseleca otěhotníte nebo se domníváte, že můžete být těhotná, přestaňte přípravek Jyseleca užívat a ihned informujte svého lékaře.
- Pokud plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.

Během užívání přípravku Jyseleca nekojte.

Potíže se srdcem

Přípravek Jyseleca může vést ke zvýšenému riziku některých srdečních onemocnění. Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte nepříjemný pocit na hrudi (který se může rozšířit do paží, čelistí, krku a zad), dušnost nebo závrať.