

Důležité informace pro lékaře

ZYNYZ může vyvolat imunitně zprostředkované nežádoucí účinky, které se mohou objevit kdykoli během léčby nebo i po jejím ukončení. Včasná diagnóza a vhodná léčba jsou nezbytné pro minimalizaci jejich možných následků.

Konkrétní pokyny pro léčbu naleznete v souhrnu údajů o přípravku ZYNYZ. (Databáze léků na webu SÚKL sekce doprovodné texty)

Další informace naleznete v Příbalové informaci (PIL) přípravku ZYNYZ, která je distribuována v každém balení léčivého přípravku a lze ji také vyhledat v databázi léků na webu <https://sukl.gov.cz> po zadání názvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL nebo vyžádat na emailu: eumedinfo@incyte.com.

DŮLEŽITÉ

- Nepokoušejte se léčit nežádoucí účinky sami.
- Nepřerušujte léčbu přípravkem ZYNYZ, pokud jste to nekonzultovali se svým lékařem.
- Tuto kartu noste vždy u sebe, a to ještě 4 měsíce po ukončení léčby, a předložte ji při každé návštěvě lékaře, včetně pohotovosti.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na: <https://nezadouciucinky.sukl.cz>. Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 49/48, Praha 10, 100 00, e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz. Tato informace může být také hlášena společnosti Swixx Biopharma s.r.o.: medinfo.czech@swixxbiopharma.com.

KARTA PACIENTA

ZYNYZ[®]
(retifanlimab) 500 mg

Důležité bezpečnostní informace pro minimalizaci rizika imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Přípravek ZYNYZ může způsobit kdykoli během léčby nebo dokonce i po jejím ukončení závažné nežádoucí účinky, včetně život ohrožujících. Můžete mít i více nežádoucích účinků současně.

Pokud se u vás objeví jakékoli příznaky nebo symptomy, včetně těch, které nejsou uvedeny na této kartě, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Ihned kontaktuje svého lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků:

Plíce

- Dýchací potíže
- Nový nebo zhoršující se kašel
- Bolest na hrudi

Střeva

- Častý průjem, často s krví a/nebo hlenem
- Častější stolice než obvykle
- Krevnatá, černá nebo dehtovitá stolice
- Silná bolest břicha nebo citlivost
- Nevolnost nebo zvracení

Játra

- Ztráta chuti k jídlu
- Trvalá nevolnost nebo zvracení
- Bolest v pravé části břicha
- Zbarvení očí a/nebo kůže do žluta
- Ospalost
- Tmavě zbarvená moč
- Snadnější krvácení nebo tvorba modřin než je obvyklé

Ledviny

- Snížený objem moči
- Pěnivá moč
- Krev nebo stopy krve v moči, které mohou změnit její barvu
- Oteklé kotníky
- Ztráta chuti k jídlu

Žlázy s vnitřní sekrecí

- Rychlý srdeční tep
- Závratě nebo mdloby
- Extrémní únava
- Přetrvávající nebo neobvyklé bolesti hlavy
- Změna hmotnosti
- Pocit chladu
- Vypadávání vlasů

Cukrovka typu 1 nebo diabetická ketoacidóza

- Větší hlad nebo žízeň než obvykle
- Časté močení
- Úbytek hmotnosti
- Únava nebo nevolnost
- Potíže s jasným uvažováním
- Rychlé a hluboké dýchání
- Dech, který voní sladce nebo ovocně
- Sladká nebo kovová chuť v ústech
- Bolest žaludku

- Ospalost
- Odlišný zápach moči nebo potu

Kůže

- Vyrážka nebo svědění
- Puchýře nebo vředy v ústech nebo na sliznici nosu, krku nebo genitálií

Ostatní orgány

- Změny zraku
- Bolest/citlivost, otok, ztuhlost, teplo a zarudnutí kloubů a svalů
- Bolest na hrudi a bušení srdce
- Snížená citlivost nebo její ztráta a poruchy pohybu

Důležité kontaktní informace

Jméno předepisujícího lékaře

Telefon do ordinace

Telefon mimo pracovní dobu