

Důležité kontaktní informace

Jméno lékaře

Telefonní číslo lékaře

Kontakt na pracoviště

Tento přehled nežádoucích účinků není úplný a je třeba se seznámit i s možnými dalšími nežádoucími účinky v Příbalové informaci, která je distribuována v každém balení léčivého přípravku a lze jí také vyhledat na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (sukl.gov.cz/) v Databázi léků po zadání názvu léčivého přípravku (prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html# / v sekci Doprovodné texty pod zkratkou PIL.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému na:

*sukl.gov.cz/nezadouciucinky, nebo
zaslat na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor
farmakovigilance, Šrobárova 49/48,
Praha 10, 100 41, e-mail:
farmakovigilance@sukl.gov.cz.*

KARTA PACIENTA

LOQTORZI (toripalimab)

Důležité bezpečnostní informace ke snížení rizika imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků, které musíte znát před zahájením a v průběhu léčby .

Pro více informací se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z níže uvedených příznaků nebo pokud se projevy zhorší projevů, ihned to sdělte svému lékaři.

Nežádoucí účinky se mohou objevit kdykoli během léčby nebo po jejím skončení. Včasná diagnóza a odpovídající léčba jsou nezbytné pro minimalizaci jakýchkoli následků. Mohou postihnout jeden i více orgánových systémů současně, ve vzácných případech mohou vést k úmrtí.

DŮLEŽITÉ

- Mějte tuto kartu pacienta neustále u sebe po celou dobu léčby a ještě 4 měsíce poté
- Ukažte tuto kartu každému lékaři, který se podílí na Vaší zdravotní péči, nebo pokud navštívíte pohotovost.

Nesnažte se potíže diagnostikovat ani léčit sami!

Problémy s plícemi

- Bolest na hrudi nebo kašel
- Dušnost

Problémy s Játry

- Bolest na pravé straně břicha
- Zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)
- Tmavá moč
- Snadnější krvácení nebo tvorba modřin než obvykle

Problémy se střevy

- Průjem nebo častější vyprazdňování než obvykle
- Černá, dehtovitá stolice nebo stolice obsahující krev či hlen
- Silná bolest břicha

Problémy s ledvinami

- Změny množství nebo barvy moči

Poruchy žláz s vnitřní sekrecí

- Rychlý srdeční tep
- Bolesti svalů
- Pokles nebo nárůst tělesné hmotnosti
- Pocit chladu
- Zácpa
- Závratě nebo mdloby
- Bolesti hlavy, které neustupují, nebo neobvyklé bolesti hlavy
- Zvýšené pocení
- Únava

Diabetes mellitus 1. Typu (cukrovka)

- Větších hlad nebo žízeň
- Častějšího močení
- Hubnutí

Poruchy kůže

- Vyrážka, svědění, olupování nebo vředy
- Vředy v ústech nebo na sliznici nosu, úst nebo v oblasti genitálií

Problémy se srdcem

- Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep, bušení srdce, zadýchávání

Projevy poruch dalších orgánů

- Svaly: bolest nebo slabost svalů
- Slinivka břišní: bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení
- Oko: změny zraku, citlivost na světlo
- Nervy: silná svalová slabost, necitlivost, brnění, potíže s chůzí