Penthrox®
(methoxyfluran)

Karta pro pacienta

Tento léčivý přípravek může způsobit poškození JATER nebo LEDVINI.

Datum podání: .....

Ošetřující lékař / zdravotnické pracoviště – kontaktní údaje:

.....

Verze: 1

Vážený pacienti a zákonní zástupci / pečující osoby,

tento léčivý přípravek může způsobit poškození jater a ledvin, které se mohou objevit v průběhu dnů až týdnů po jeho podání.

Kartu pacienta noste neustále s sebou a předkládejte ji při jakékoli terapeutické nebo diagnostické proceduře.

- ztráta chuti k jídlu
- nevolnost
- zvracení
- tmavě zabarvená moč
- snížené nebo nadměrné močení
- světle zbarvená stolice
- bolest nebo citlivost na dotek v pravé horní části břicha (pod žebry)
- otok chodidel nebo spodní části nohou
- žloutenka (zežloutnutí kůže a/nebo očního bělma)

Na tomto odkazu naleznete příbalovou informaci/ souhrn informací o přípravku léčivého přípravku: https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

Nežádoucí účinky můžete hlásit na webu sukl.gov.cz/nezadouciucinky

Adresa: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48/49, 100 00 Praha 10, email: farmakovigilance@sukl.gov.cz.

Tato informace může být také hlášena společnosti Medis Pharma s.r.o., Národní 60/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, email: safety@medis.com

EdT-CZ-PEN-0626-003