KARTA PACIENTA LÉČENÉHO PŘÍPRAVKEM
s obsahem tocilizumabu

Verze: 7.0 Schváleno SÚKL: 08/2026

ÚDAJE O LÉČBĚ PŘÍPRAVKEM s obsahem tocilizumabu**:***

Název přípravku: .....
Datum zahájení léčby: .....
Způsob aplikace: .....
Datum poslední aplikace: .....
Jméno pacienta: .....
Jméno rodiče/opatrovníka: .....
.....
Telefon na rodiče/opatrovníka: .....
Jméno lékaře: .....
Telefon lékaře: .....
Adresa lékaře: .....
.....

*Mějte s sebou při každé návštěvě lékaře také seznam všech ostatních léků, které berete Vy nebo Vaše dítě.

Verze: 7.0 Schváleno SÚKL: 08/2026

KARTA PACIENTA LÉČENÉHO PŘÍPRAVKEM s obsahem tocilizumabu

Tuto kartu noste u sebe v době, kdy absolvujete Vy nebo Vaše dítě léčbu přípravkem **s obsahem tocilizumabu** a ještě 3 měsíce po poslední dávce přípravku **s obsahem tocilizumabu**, která je Vám nebo Vašemu dítěti aplikována, protože nežádoucí účinky se mohou objevit až nějakou dobu po poslední dávce přípravku **s obsahem tocilizumabu.** Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte objeví jakýkoli neočekávaný účinek a byl/a jste v minulosti léčen/a přípravkem **s obsahem tocilizumabu**, kontaktujte, prosím, svého lékaře, který Vám poradí.

Tato karta pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které by měli pacienti nebo jejich rodiče/opatrovníci znát před zahájením, i během a po ukončení léčby přípravkem **s obsahem tocilizumabu**.

- Ukažte tuto kartu KAŽDÉMU zdravotnickému pracovníkovi, který Vás nebo Vaše dítě léčí.

- Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci přípravku **s obsahem tocilizumabu**, která je vložena v každém balení přípravku a lze ji také vyhledat na webu SÚKL na adrese https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/ po zadání názvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL. Na konci příbalové informace lze také dohledat podrobné instrukce pro podání přípravku.

Některé z léčivých přípravků obsahujících (tocilizumab) podléhají následnému sledování, což je vyznačeno přítomností symbolu obráceného černého trojúhelníku na balení a textech doprovázejících léčivý přípravek následujícím způsobem:

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

INFEKCE

Přípravek **s obsahem tocilizumabu** zvyšuje riziko vzniku infekcí, které mohou být závažné, pokud se neléčí. Navíc se některé dříve prodělané infekce mohou objevit znovu.

Vy nebo Vaše dítě by(ste) neměl(a) být léčen(a) přípravkem **s obsahem tocilizumabu**, pokud trpíte závažnou infekcí.

Před zahájením léčby přípravkem **s obsahem tocilizumabu** byste měl(a) být Vy nebo Vaše dítě testován(a) na přítomnost aktivní tuberkulózy (TBC).

Před zahájením léčby přípravkem **s obsahem tocilizumabu** řekněte svému lékaři a sestře o všech očkováních, která byste mohl(a) Vy nebo Vaše dítě potřebovat.

Pokud trpíte Vy nebo Vaše dítě užívající přípravek **s obsahem tocilizumabu** jakoukoli infekcí (třeba i nachlazením) v době, kdy máte Vy nebo Vaše dítě podstoupit další podání injekce/infuze, měla by být injekce/infuze odložena, dokud se nebudete Vy nebo Vaše dítě cítit lépe.

Mladší děti se sJIA nebo pJIA možná nebudou zcela schopné popsat příznaky svého onemocnění, proto by měli rodiče/opatrovníci pacientů se sJIA nebo pJIA neprodleně kontaktovat zdravotnického pracovníka, pokud se dítě necítí dobře bez jakékoli zjevné příčiny.

KOMPLIKACE DIVERTIKULÓZNÍHO ONEMOCNĚNÍ

U pacientů používajících přípravek **s obsahem tocilizumabu** se mohou rozvinout komplikace divertikulitidy (zánětlivé výchlipky na tlustém střevě), které, pokud se neléčí, mohou být závažné.

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte užívajícího přípravek **s obsahem tocilizumabu** objeví bolest břicha, kolika, nebo zaznamenáte krev ve stolici, **vyhledejte okamžitě lékaře.**

JATERNÍ TOXICITA

U pacientů používajících přípravek s **obsahem tocilizumabu** se může vyvinout závažné poškození jater. Jestliže trpíte **jaterním onemocněním**, oznamte to lékaři.

Jaterní potíže se mohou projevovat zvýšením jaterních enzymů, které je odhaleno při laboratorním vyšetření krve u pacientů léčených tocilizumabem. Lékař u Vás bude během léčby přípravkem **s obsahem tocilizumabu** pečlivě sledovat změny jaterních enzymů v krvi a přijme vhodná opatření.

Jestliže u Vás dojde k zežloutnutí kůže a očí, k tmavě hnědému zbarvení moči, bolesti nebo otoku v pravé horní oblasti břicha nebo velké únavě a zmatenosti, **OKAMŽITĚ SE OBRAŤTE NA LÉKAŘE**. Zvýšení jaterních enzymů také nemusí mít žádné příznaky.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím webového formuláře https://nezadouciucinky.sukl.cz/, případně na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz.

Je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.