▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím webového formuláře **sukl.gov.cz/nezadouciucinky**, případně na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 49/48, 100 00Praha 10, e-mail: **farmakovigilance@sukl.gov.cz**. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Tato informace může být také hlášena společnosti Pfizer: **CZE.AEReporting@pfizer.com**; Telefon: 283 004 111

Verze 2, schváleno SÚKL 8.9.2026

HYM-2026-002

Tuto kartu noste stále u sebe. UKAŽTE ji každému zdravotnickému pracovníkovi, který se podílí na Vaší léčbě a při návštěvě pohotovosti.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO PACIENTY LÉČENÉ PŘÍPRAVKEM HYMPAVZI (marstacimab)

Jaké nejdůležitější informace bych měl(a) znát o přípravku Hympavzi?

Přípravek Hympavzi je určen k prevenci nebo snížení krvácení u pacientů ve věku 12 let a starších, vážících alespoň 35 kg s:

- hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII), u kterých se nevyvinuly inhibitory faktoru VIII se závažným onemocněním (hladina faktoru VIII v krvi je nižší než 1 %), nebo u kterých se vyvinuly inhibitory faktoru VIII,
- hemofilií B (vrozený nedostatek faktoru IX), u kterých se nevyvinuly inhibitory faktoru IX se závažným onemocněním (hladina faktoru IX v krvi je nižší než 1 %), nebo u kterých se vyvinuly inhibitory faktoru IX.

Hympavzi pomáhá zvýšit srážlivost krve. Přípravek Hympavzi a jemu podobné léky mohou způsobit vznik krevních sraženin v cévách (trombózu), které když se uvolní, mohou v krevním oběhu způsobit ucpání dalších cév (takzvané tromboembolické příhody). V závislosti na umístění a závažnosti mohou být tromboembolické příhody život ohrožující až smrtelné. Riziko ucpání cév (tromboembolických příhod) může být vyšší během chirurgických zákroků a po nich (perioperační období).

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI PRO PACIENTY

PŘESTAŇTE POUŽÍVAT přípravek Hympavzi a okamžitě se poraďte s lékařem, pokud zaznamenáte některý z příznaků možné krevní sraženiny, včetně následujících nežádoucích účinků:

- otok nebo bolest v pažích nebo nohách
- zarudnutí nebo změna barvy paží nebo nohou
- dušnost
- bolest na hrudi nebo horní části zad
- pocit na omdlení
- rychlý srdeční tep
- necitlivost ve tváři
- bolest hlavy
- bolest nebo otok očí
- problémy se zrakem
- vykašlávání krve

ZAPAMATUJTE SI: Pokud zaznamenáte **kterýkoli** z těchto příznaků, přestaňte přípravek Hympavzi používat a ihned kontaktujte lékaře nebo vyhledejte pohotovostní službu! Výše uvedené nemusí být všechny možné příznaky krevních sraženin. Informujte lékaře o jakýkoli příznacích, které Vás obtěžují nebo neustupují. Pokud máte naplánovaný chirurgický zákrok, informujte lékaře, že podstupujete léčbu přípravkem Hympavzi.

INFORMACE O PACIENTOVI A OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘI

Ošetřující lékař má vyplnit identifikační údaje pacienta, informace o léčbě a uvést své kontaktní údaje. Noste tuto kartu stále u sebe a ukažte ji v případě pohotovostního ošetření zdravotnickému personálu.

Jméno pacienta: .....

Zahájení léčby přípravkem Hympavzi: .....

Kontaktní osoba pro nouzové situace: .....

Telefonní číslo pro nouzové situace: .....

Ošetřující lékař: .....

Kontaktní údaje lékaře: .....